

Tabla Tratamientos erradicadores¹⁴

NO ALÉRGICOS A PENICILINA					
	País	Esquema terapéutico	Duración	Coste (€)	Nº visitas
1ª línea	Cuádruple concomitante sin bismuto - OCAM	Omeprazol 20 mg/12 h Clarithromicina 500 mg/12 h Amoxicilina 1 g/12 h Metronidazol 500 mg/12 h	14 días	38,90	5-0-0-5
	Tríplice - OCA País afectado en poblaciones con tasas de resistencia a claritromicina > 17%, y sin exposición previa a claritromicina	Omeprazol 20-40 mg /12 h* Clarithromicina 500 mg/12 h Amoxicilina 1 g/12 h	14 días	33,83-30,25	3-0-0-3
2ª línea	Cuádruple con bismuto CBMT	Omeprazol 20 mg/12 h Bismuto subcitrate 240 mg/12 h ó 120 mg/6 h Metronidazol 500 mg/8 h Doxiciclina 100 mg/12 h ^a	10 días 14 días	19 31,67	6-2-0-6
	Pylora [®] + omeprazol	Omeprazol 20 mg/12 h Bismuto subcitrate potasio 420 mg/6 h	10 días	64,86	4-3-3-4
		Metronidazol 375 mg/6 h Tetraciclina 375 mg/6 h	14 días	127,30	4-3-3-4
3ª línea	Tríplice con levofloxacino (OLA) con o sin bismuto	Omeprazol 20 mg/12 h Levofloxacino 500 mg/24 h Amoxicilina 1 g/12 h +/- Bismuto subcitrate 240 mg/12 h	14 días	61,81	3-0-0-2
				80,99	5-0-0-4
ALÉRGICOS A PENICILINA					
	País	Esquema terapéutico	Duración	Coste (€)	Nº visitas
1ª línea	Cuádruple con bismuto CBMT	Omeprazol 20 mg/12 h Bismuto subcitrate 240 mg/12 h ó 120 mg/6 h Metronidazol 500 mg/8 h Doxiciclina 100 mg/12 h ^a	10 días 14 días	19 31,67	6-2-0-6
	Pylora [®] + omeprazol	Omeprazol 20 mg/12 h Bismuto subcitrate potasio 420 mg/6 h	10 días	64,86	4-3-3-4
Metronidazol 375 mg/6 h Tetraciclina 375 mg/6 h		14 días	127,30	4-3-3-4	
2ª línea	Tríplice con levofloxacino y claritromicina	Omeprazol 20 mg/12h Clarithromicina 500 mg/12 h Levofloxacino 500 mg/24 h	10 días	79,36	3-0-0-2

* En este país, algunos autores recomiendan dosis altas de 60