

Publicado: Miércoles, 22 Junio 2022 00:00



Tratamiento farmacológico en DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

Prescripción

¿Cuándo?

- Diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer (EA)
- Fase leve, moderada o grave (GDS entre 4 y 7)
- Previsión de buena adherencia terapéutica.

¿Quién?


- Médico experto en diagnóstico y tratamiento de EA: **Neurología, Medicina Interna, Psiquiatría y Geriátrica.**
- La prescripción inicial en Atención Primaria es posible en caso de informe que indique la terapia antidemencia.

¿Cómo?

Visado inicial y anual

FASE	LEVE GDS 4	MODERADA GDS 5	MOD-GRAVE GDS 6	GRAVE GDS 7
Paciente de nuevo diagnóstico	<p>DONEPEZILO RIVASTIGMINA GALANTAMINA</p> <p>Prescripción de un fármaco IACE en MONOTERAPIA. No existe diferencia significativa en la eficacia de los tres IACE.</p>			<p>MEMANTINA</p> <p>Si deterioro cognitivo grave establecido valorar cambio de IACE por MEMANTINA. La terapia combinada no se recomienda en esta fase.</p>
Pretatado con IACE	<p>MEMANTINA</p> <p>Valorar Memantina en BITERAPIA con IACE</p>			
Intolerancia a IACE Contraindicación de IACE	<p>MEMANTINA</p>			

DEPRESCRIPCIÓN en DEMENCIA de INHIBIDOR DE ACETILCOLINESTERASA e INHIBIDOR DE NMDA





Demencia con cuerpos de Lewy

Tratamiento farmacológico en DEMENCIA NO ALZHEIMER

	LEVE	MODERADA	GRAVE
Sin contraindicaciones	 DONEPEZILO RIVASTIGMINA Ofrecer DONEPEZILO o RIVASTIGMINA en MONOTERAPIA.		 DONEPEZILO RIVASTIGMINA Valorar continuación con DONEPEZILO o RIVASTIGMINA en MONOTERAPIA
Intolerancia a DONEPEZILO o RIVASTIGMINA	 GALANTAMINA Valorar GALANTAMINA en MONOTERAPIA		
Contraindicación de IACE	 MEMANTINA Valorar MEMANTINA en MONOTERAPIA		

Demencia Vascolar

Tratamiento ANTIDEMENCIA en caso de comorbilidad de enfermedad neurodegenerativa:

- Enfermedad de Alzheimer.
- Enfermedad de Parkinson.
- Enfermedad con cuerpos de Lewy.



Demencia frontotemporal

No se recomienda el uso de tratamiento ANTIDEMENCIA:



Demencia con Enfermedad de Parkinson



RIVASTIGMINA ha demostrado, respecto al resto de IACE, mayor beneficio clínico en el control de síntomas cognitivos, conductuales y desempeño de actividades diarias.

No ocasiona empeoramiento de síntomas motores

Recomendaciones para el uso racional del medicamento en el tratamiento farmacológico de las demencias

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER y otras DEMENCIAS DEGENERATIVAS

